

Erhebungsbogen

B

Projekt	FFH-Monitoring	Interne Nr.	45035
		DK5 DK5-GK	7048 7050
		DK5 - Name	Lemsahl-Mellingstedt-West
Handlungsbedarf	Nein	Biotop-Nr. alt	109 132
Bearbeitung	BUC	Kartierung	14.06.2007
Räumliche Abbildung	Fläche	Fläche / Länge [m²/m]	2555,9982
Anzahl Abschnitte	1	Breite (lineare Abb.) [m]	

Gesetzlicher Schutz	§ 30 (2) 2.1 Moore	Schutz nur teilweise	Nein
----------------------------	--------------------	-----------------------------	------

Gesamtbewertung	7	Besonders wertvoll
– Alter	6	Biotop mittleren Alters, 50 bis 100 Jahre
– Belastungsgrad	7	Flächenhaft geringe oder Vorbelastung mit schwachem Einfluß
– Ökolog. Funktion	7	Sehr hohe Bedeutung in einem Biotopkomplex, für den lokalen Biotopverbund oder als Puffer
– Seltenheit	6	Seltener Biotoptyp, ohne seltene oder bedrohte Pflges., ungesättigtes Artenspektrum, reliktsche RL-Arten

Bestandsbeschreibung

Die Pfeifengras-Fläche erstreckt sich als schmales Band am östlichen Rand des Moor-Regenerationsbereiches und ragt nach Westen leicht in die nassen Moorflächen hinein. Neben dem Blauen Pfeifengras treten Flatter-Binse sowie vereinzelt Torfmoos und Glocken-Heide auf. Daneben sind einzelne Moor-Birken im Bestand vertreten. Auffällig ist jedoch der hohe Anteil an Moor-Birke in der Strauchschicht, die die Fläche zunehmend prägt.

Vorkommen an Biotoptypen

1	TF	Typ	HF	F.Anteil
2	BTYP	Biotoptyp		- gesetzl. Grundl.
3	Zusatz	Zusatz zum Biotoptypen		
4	LRT	Lebensraumtyp		
1	1		Ja	100 %
2	MMF	Feuchtes Pfeifengras-Moordegenerationsstadium (2000)		
3	v	Verbuschung, spontanes Gehölzaufkommen (v)		
4	7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore		

Räumliche Lage

Lagebeschreibung	Nördlich des Moordamms		
Nachbarnutzung/en	Wiese, Birken-Moorwald, Moor-Regenerationsbereich		
Rechtswert (X)	570549	Hochwert (Y)	5949549
Bezirk	Wandsbek	Naturraum	Alstertal (696.02)
Stadtteil (OT-Nr.)	Lemsahl-Mellingstedt (521)	Gemarkung	Lemsahl-Mellingstedt (533)
Digitaler Grünplan	<input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet	<input type="checkbox"/> Ramsargebiet	<input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb.
Ausgleichsflächen	<input type="checkbox"/> Biosphärenreservat	<input type="checkbox"/> Nationalpark	<input type="checkbox"/>
NSG / ND / LSG	NSG Wittmoor [HH-504 / Anteil: 100%]		
FFH-GEBIET	Wittmoor [DE 2226-307 / Anteil: 100%]		
Wasserschutzgebiet			


Erhebungsbogen

B

Projekt	FFH-Monitoring	Interne Nr.	45035
		DK5 DK5-GK	7048 7050
		DK5 - Name	Lemsahl-Mellingstedt-West
Handlungsbedarf	Nein	Biotop-Nr. alt	109 132
Bearbeitung	BUC	Kartierung	14.06.2007
Räumliche Abbildung	Fläche	Fläche / Länge [m²/m]	2555,9982
Anzahl Abschnitte	1	Breite (lineare Abb.) [m]	

Räumliche Lage

Karte



Weitere Erhebungsbögen

Interne Nr.	Interne Nr. Zuordnung	DK5	Biotop-Nr.	Kartierung	Zuordnung	DK5 (GK)	Biotop-Nr. (alt)
45035	45036	7048	109	30.07.2011	K	7050	132
45035	71036	7048	229	14.06.2004	>	7050	1007

Zuordnung: N = nachfolgende Kartierung, K = weitere Kartierungen (zeitlich vorher oder nachher)

Foto

Interne Nr.	Index	Dateiname	Aufnahmerichtung
13244	0	7048_109_140607_1.JPG	
54984	0	7048_109_140607_2.JPG	

Projekt	FFH-Monitoring	Interne Nr.	45035
		DK5 DK5-GK	7048 7050
		DK5 - Name	Lemsahl-Mellingstedt-West
Handlungsbedarf	Nein	Biotop-Nr. alt	109 132
Bearbeitung	BUC	Kartierung	14.06.2007
Räumliche Abbildung	Fläche	Fläche / Länge [m²/m]	2555,9982
Anzahl Abschnitte	1	Breite (lineare Abb.) [m]	

Weitere Angaben

Merkmal	Wert
Auswertung	
Gefährdung / Einflüsse	Zu den Beeinträchtigungen zählen der Lärm durch Flugverkehr sowie die Geräuschkulisse des westlich gelegenen Gewerbegebietes. Auffällig ist das hohe Aufkommen von Gehölzen, die durch hohen Wasserverbrauch und durch zunehmende Verdichtung den Bestand gefährden können.
Maßnahmen	Um den Bestand zu schützen, sollte eine kontrollierte Entfernung des Gehölzaufkommens durchgeführt sowie eine erweiterte Vernässung angestrebt werden.

Foto

Fotodatei	7048_109_140607_1.JPG	Fotodatei	7048_109_140607_2.JPG
Bildbeschreibung		Bildbeschreibung	k.A.
Aufnahmerichtung		Aufnahmerichtung	



Teilflächenbeschreibung

Teilflächentyp	Feuchtes Pfeifengras-Moordegenerationsstadium (2000)	Teilflächen-Nr.	1
Biotoptyp		Biotoptyp	MMF
- Zusatz	Verbuschung, spontanes Gehölzaufkommen (v)	- gesetzl. Grundl.	
FFH-LRT	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	FFH-LRT	7120
Beschreibung	Gefährdungen: Zu den Beeinträchtigungen zählen der Lärm durch Flugverkehr sowie die Geräuschkulisse des westlich gelegenen Gewerbegebietes. Auffällig ist das hohe Aufkommen von Birken, die durch hohen Wasserverbrauch und durch zunehmende Verdichtung den B	Entw.potential LRT	Ja
		Hauptfläche	100 %
		Flächenanteil	Nein
		FFH-Unters.Fläche	Nein
		Saatgutfläche	Nein

Erhebungsbogen

B

Projekt	FFH-Monitoring	Interne Nr.	45035
		DK5 DK5-GK	7048 7050
		DK5 - Name	Lemsahl-Mellingstedt-West
Handlungsbedarf	Nein	Biotop-Nr. alt	109 132
Bearbeitung	BUC	Kartierung	14.06.2007
Räumliche Abbildung	Fläche	Fläche / Länge [m²/m]	2555,9982
Anzahl Abschnitte	1	Breite (lineare Abb.) [m]	

Weitere Angaben

Merkmal	Wert
Boden	
Feuchte	7 - feucht
Stickstoffgehalt	3 - stickstoffarm
Standort, Relief	
Neigung - Gelände	N0 - nicht geneigt (<2 %)
Belichtung	7 - halbsonnig
Luft	keine Besonderheiten
Veg. - Deckg./Ant.	
Gesamt	100 %
1. Baumschicht	10 %
Strauchschicht	15 %
1. Krautschicht	100 %
Mooschicht	3 %

FFH-Bewertungen (HH)

Lebensraumtyp / Parameter	Wertstufe A	Wertstufe B	Wertstufe C	Wert / Begründung	Z
7120 (HH) Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore					C
Habitatstrukturen					
Bestandsstruktur;	günstig	mittel	ungünstig		C
Schlenken und Bulte;	ja	nein	nein		C
Torfwachst. in Senken; Anteil der moortypischen Vegetationstypen: Deckungsgrad % oder geschätzt: hoch, mittel, gering	> 50%	10-50%	< 10%		C
Erica- / Wollgras-Stad.; Anteil der moortypischen Vegetationstypen: Deckungsgrad % oder geschätzt: hoch, mittel, gering	> 50%	50-25%	< 25%		C
Molinia- / Calluna-Stad.; Anteil der moortypischen Vegetationstypen: Deckungsgrad % oder geschätzt: hoch, mittel, gering	< 25%	25-50%	> 50%		C
Gehölze; Anteil der moortypischen Vegetationstypen: Deckungsgrad % oder geschätzt: hoch, mittel, gering	< 10%	10-25%	> 25%		B
Standortstrukturen;					
Höhenunterschiede; anthropogene Höhenunterschiede	günstig	mittel	ungünstig		A
	< 0,5 m	0,5-1 m	> 1 m		A
Beeinträchtigungen					
Störungen des Standortes;	günstig	mittel	ungünstig		A
Handtorfstiche;	keine	wenig	zahlreich		A
Abstand Wasser / GOF;	gering	mittel	hoch		B
Entwässerungsgräben; intern: Graben in der Fläche, extern: Graben am Rand der Fläche	keine	extern	intern		A

Erhebungsbogen

B

Projekt	FFH-Monitoring	Interne Nr.	45035
		DK5 DK5-GK	7048 7050
		DK5 - Name	Lemsahl-Mellingstedt-West
Handlungsbedarf	Nein	Biotop-Nr. alt	109 132
Bearbeitung	BUC	Kartierung	14.06.2007
Räumliche Abbildung	Fläche	Fläche / Länge [m²/m]	2555,9982
Anzahl Abschnitte	1	Breite (lineare Abb.) [m]	

FFH-Bewertungen (HH)

Lebensraumtyp / Parameter	Wertstufe A	Wertstufe B	Wertstufe C	Wert / Begründung	Z
Abstand zu Emittenten; auch angrenz. landw. Nutzungen	hoch	mittel	gering		A
Untypische Vegetationsaspekte;	günstig	mittel	ungünstig		B
Gehölze (v.a. Birken);	< 10%	10-25%	> 25%		B
Eutrophierungszeiger;	keine	wenige	zahlreich		B
Wasserzügigkeitszeiger; z.B. Berula erecta in Gräben	keine	wenige	zahlreich		A
Nutzungen;	günstig	mittel	ungünstig		A
Trittschäden;	keine	gering	stark		A
Wildfütterung;	keine	gering	stark		A
Müllablagerungen , Wildfütterung;	keine	gering	stark		A
hörbarer, dauerh. Lärm;	kein	deutl.	stark		B
Arteninventar					C

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

Standort	Belichtung	halbsonnig	7
Boden	Feuchte	feucht	7,1
	Stickstoff (N)	sehr stickstoffarm	2,2
	Reaktion	sauer	2,8
Vegetation	Mahdverträglichkeit	schnittempfindlich (nur Herbstschnitt vertragend)	2,9
Zeigerwerte	Futterwert	sehr geringwertiges Futter	1,9
	Wechselfeuchteanzeiger		1
	Giftpflanzen		0
	Überschw.anzeiger		0

Pflanzenartenliste

Gruppe / Pflanzenart	MS	M	W	Vs	St	PA	Ph	Sz	VS	V	G	cf	§	Rote Liste			
														HH	ND	SH	D
Tracheobionta (Gefäßpflanzen)																	
Betula pubescens (Moor-Birke)	7	z	S	B1													
Betula pubescens (Moor-Birke)	7	z	S	S													
Calluna vulgaris (Besenheide)	7	w	T	-									3		V		
Dryopteris carthusiana (Dorniger Wurmfarne)	7	w		-													
Erica tetralix (Glocken-Heide)	7	w	W	-									2		V V		
Frangula alnus (Faulbaum)	7	w		S													
Juncus effusus (Flatter-Binse)	7	w	S	-													
Molinia caerulea (Blaues Pfeifengras)	7	d	T	-													
Quercus robur (Stiel-Eiche)	7	z	S	S													
Rubus idaeus (Himbeere)	7	w		S													
Bryophyta (Moose)																	
Sphagnum spec. (Torfmoos)	7	w		M													
														Anzahl Rote Liste Arten	2	2	1
														Anzahl Arten	10		

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

Projekt	FFH-Monitoring			Interne Nr.	45035
				DK5 DK5-GK	7048 7050
				DK5 - Name	Lemsahl-Mellingstedt- West
Handlungsbedarf	Nein			Biotop-Nr. alt	109 132
Bearbeitung	BUC	Kopie	Nein	Kartierung	14.06.2007
Räumliche Abbildung	Fläche			Fläche / Länge [m²/m]	2555,9982
Anzahl Abschnitte	1			Breite (lineare Abb.) [m]	