

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg, Datenbestand aus FoxPro | Interne Nr. | 52127 |
| | | DK5 DK5-GK | 7424 7626 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Reitbrook |
| Bearbeitung | BUC Kopie Nein | Biotop-Nr. alt | 451 7 |
| Räumliche Abbildung | Linie | Kartierung | 15.09.1995 |
| Anzahl Abschnitte | 2 | Fläche / Länge [m²/m] | 102,079 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Gesetzlicher Schutz **kein gesetzl. Schutz** **kein gesetzlich geschütztes Biotop** **Schutz nur teilweise** **Nein**

Gesamtbewertung 0 keine Angabe

- **Alter**
- **Belastungsgrad**
- **Ökolog. Funktion**
- **Seltenheit**

Bestandsbeschreibung

Entspricht der Kartierung Winzer 1982.

Kopierter Text aus der Vorkartierung:

Zwei kurze Baumreihen aus bis zu 5m hohen, als Kopfweiden ausgebildete Silber-Weiden, Stämme mit einem Durchmesser von ca. 70 cm, bei einigen Weiden bis an die Stammbasis aufgespalten, Holz z.T. stark zersetzt.

Spezielle Nutzungen: benachbart: Wiesen, Elbe, Straße

Nutzungsintensität:

Vorkommende Pflanzengesellschaften: ohne Angabe

2004: Auf der intensiv genutzten Weidefläche gibt es keine Baumreihen mehr. Michael Schöne

Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF | Typ | HF | F.Anteil |
|---|--------|---|----|--------------------|
| 2 | BTYP | Biotoptyp | | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | Zusatz | Zusatz zum Biotoptypen | | |
| 4 | LRT | Lebensraumtyp | | |
| 1 | 1 | | Ja | 100 % |
| 2 | HEA | Baumreihe, Allee (2000) | | |
| 3 | wk | Kopfbäume, Knickharfen, alte Stubben (wk) | | |

Räumliche Lage

| | | | |
|---------------------------|---|--|--|
| Lagebeschreibung | Zwischen Dove-Elbe und Allermöher Deich | | |
| Nachbarnutzung/en | | | |
| Rechtswert (X) | 575938 | Hochwert (Y) | 5925391 |
| Bezirk | Bergedorf | Naturraum | Vier- und Marschlande (673.10) |
| Stadtteil (OT-Nr.) | Allermöhe (610) | Gemarkung | Allermöhe (601) |
| Digitaler Grünplan | <input type="checkbox"/> Hafengesamtgebiet | <input type="checkbox"/> Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> EG-Vogelschutzgeb. |
| Ausgleichsflächen | <input checked="" type="checkbox"/> Biosphärenreservat | <input type="checkbox"/> Nationalpark | <input type="checkbox"/> |
| NSG / ND / LSG | LSG Allermöhe [HH-2001 / Anteil: 100%] | | |
| FFH-GEBIET | | | |
| Wasserschutzgebiet | | | |


Erhebungsbogen

B

| | | | | |
|----------------------------|--|---|-------------|------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg, Datenbestand aus FoxPro | Interne Nr. | 52127 | |
| | | DK5 DK5-GK | 7424 | 7626 |
| | | DK5 - Name | Reitbrook | |
| Handlungsbedarf | Nein | Biotop-Nr. alt | 451 | 7 |
| Bearbeitung | BUC | Kartierung | 15.09.1995 | |
| Räumliche Abbildung | Linie | Fläche / Länge [m²/m] | 102,079 | |
| Anzahl Abschnitte | 2 | Breite (lineare Abb.) [m] | | |

Räumliche Lage

Karte



Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|------------------------|--|
| Auswertung | |
| Gefährdung / Einflüsse | Schnitt der Äste) auseinandergebrochen. |
| Wertgesichtspunkte | Stämme einiger Weiden aufgrund mangelnder Pflege (kein regel Baumreihen aus Kopfweiden mittleren Alters mit meist bis an den Boden aufgespaltenen Stämmen, zur Erhaltung sind regelmäßige Dominanz von Nadelgehölzen |
| Maßnahmen | Pflegemaßnahmen notwendig. 5 Jahren. Regelmäßiger Schnitt der ausgetriebenen Äste im Abstand von ca. |

Erhebungsbogen

B

| | | | | |
|----------------------------|--|---|-------------|------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg, Datenbestand aus FoxPro | Interne Nr. | 52127 | |
| | | DK5 DK5-GK | 7424 | 7626 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Reitbrook | |
| Bearbeitung | BUC | Biotop-Nr. alt | 451 | 7 |
| Räumliche Abbildung | Linie | Kartierung | 15.09.1995 | |
| Anzahl Abschnitte | 2 | Fläche / Länge [m²/m] | 102,079 | |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | | |

Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|-------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 1 |
| Biotoptyp | Baumreihe, Allee (2000) | Biotoptyp | HEA |
| - Zusatz | Kopfbäume, Knickharfen, alte Stubben (wk) | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | | FFH-LRT | |
| Beschreibung | | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | Ja |
| | | Flächenanteil | 100 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|-------------------------|------------|
| Standort, Relief | |
| Relief | Flußmarsch |

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|-----------------|---|
| Standort | Belichtung | | |
| Boden | Feuchte | naß | 8 |
| | Stickstoff (N) | stickstoffreich | 7 |
| | Reaktion | schwach basisch | 8 |
| Vegetation | Mahdverträglichkeit | | |
| Zeigerwerte | Futterwert | | |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 0 |
| | Giftpflanzen | | 0 |
| | Überschw.anzeiger | | 1 |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste | | | |
|--|----|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | HH | ND | SH | D |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salix alba coerulea (Weiße Silber-Weide) | 7 | X | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Rote Liste Arten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Arten | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland