

Erhebungsbogen

B

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|----------------|------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | | Interne Nr. | 66075 | |
| | | | DK5 DK5-GK | 8018 | 8020 |
| Handlungsbedarf | Nein | | DK5 - Name | Neuengamme-Ohe | |
| Bearbeitung | BRA | Kopie | Biotop-Nr. alt | 35 | 73 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | | Kartierung | 17.06.1997 | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | Fläche / Länge [m²/m] | 8740,2644 | |
| | | | Breite (lineare Abb.) [m] | | |

| | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------|-------------|
| Gesetzlicher Schutz | _ kein gesetzl. Schutz kein gesetzlich geschütztes Biotop | Schutz nur teilweise | Nein |
|----------------------------|--|-----------------------------|-------------|

| | |
|------------------------|------------|
| Gesamtbewertung | 6 Wertvoll |
|------------------------|------------|

- Alter
- Belastungsgrad
- Ökolog. Funktion
- Seltenheit

Bestandsbeschreibung

Leicht bodenfeuchte Grünlandfläche. Im Zentrum (Tf. 2) liegt ein fast vollständig verlandter Graben. Hier ist der Boden zertreten und es steht zeitweilig Wasser in den Senken. Eine frische Ausschachtung dient als Viehtränke. Das abgelagerte Bodenmaterial ist sandig.

Der Bodenanriss zeigt eine lehmige Deckschicht über Flugsanden(!).

Der Bereich liegt rund 0,5m über dem Wasserspiegel des Gose-Elbe-Grabens und wird dauerhaft von Rindern beweidet.

Der Bewuchs ist bereits kurz verbissen, leicht bultig und stellenweise wenig von Ackerkratzdistel durchsetzt. Vom Vegetationstyp her liegt hier altes Dauergrünland vom Typ des Lolio-Cynosuretum, in den Mulden Flutrasen (Ranunculo-Alopecuretum gen.) vor.

Vorkommen an Biotoptypen

| 1 | TF | BTYP | Typ | HF | F.Anteil |
|---|----|--------|---|----|--------------------|
| 2 | | Zusatz | Biotoptyp | | - gesetzl. Grundl. |
| 3 | | LRT | Zusatz zum Biotoptypen | | |
| 4 | | | Lebensraumtyp | | |
| 1 | 1 | | | Ja | 90 % |
| 2 | | GMW | Artenreiche Weide frischer bis mittlerer Standorte (2000) | | |
| 3 | | + | besonders gute Ausprägung (struktur- oder artenreich, intakt, naturnah) (+) | | |
| 1 | 2 | | | | 10 % |
| 2 | | FGR | Nährstoffreicher Graben mit Stillgewässercharakter (2000) | | |
| 1 | 3 | | | | 0 % |
| 2 | | XXX | Zuordnung eines Biotoptyps fehlt! (2000) | | |


Räumliche Lage

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Lagebeschreibung | Östlichen Kartenblattrand, nördlich der Gose-Elbe | | | | |
| Nachbarnutzung/en | Gose-Elbe-Graben, Grünland | | | | |
| Rechtswert (X) | 581693 | Hochwert (Y) | 5918954 | | |
| Bezirk | Bergedorf | Naturraum | Vier- und Marschlande (673.10) | | |
| Stadtteil (OT-Nr.) | Neuengamme (606) | | Gemarkung | Neuengamme (610) | |
| Digitaler Grünplan | <input type="checkbox"/> | Hafengesamtgebiet | <input type="checkbox"/> | Ramsargebiet | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> | EG-Vogelschutzgeb. | <input type="checkbox"/> |
| Ausgleichsflächen | <input type="checkbox"/> | Biosphärenreservat | <input type="checkbox"/> | Nationalpark | <input type="checkbox"/> |
| NSG / ND / LSG | LSG Neuengamme [HH-2023 / Anteil: 100%] | | | | |
| FFH-GEBIET | | | | | |
| Wasserschutzgebiet | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|-------------------------|---------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | | Interne Nr. | 66075 | |
| | | | DK5 DK5-GK | 8018 | 8020 |
| Handlungsbedarf | Nein | | DK5 - Name | Neuengamme-Ohe | |
| Bearbeitung | BRA | Kopie | Nein | Biotop-Nr. alt | 35 73 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | | Kartierung | 17.06.1997 | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | Fläche / Länge [m²/m] | 8740,2644 | |
| | | | Breite (lineare Abb.) [m] | | |

Räumliche Lage

Karte



Weitere Angaben

| Merkmal | Wert |
|----------------------------------|--|
| Auswertung | |
| Gefährdung / Einflüsse | - |
| Wertgesichtspunkte | Artenreiches, altes Grünland, magerer Standort Standortpotential |
| zoologisch bedeutsame Strukturen | Blütenreiche Fluren |
| Bedeutung für Tiergruppe | Insekten, allgemein |
| Maßnahmen | Es sollte das artenreiche Grünland und das feuchte, teils sandig.-magere Standortpotential gepflegt und erhalten werden. Überbeweidungsfolgen sollten durch gelegentliche Pflegeschnitte und eine moderate Beweidung vermieden werden. |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 66075 |
| | | DK5 DK5-GK | 8018 8020 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Neuengamme-Ohe |
| Bearbeitung | BRA | Biotop-Nr. alt | 35 73 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 17.06.1997 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 8740,2644 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 1 |
| Biotoptyp | Artenreiche Weide frischer bis mittlerer Standorte (2000) | Biotoptyp | GMW |
| - Zusatz | besonders gute Ausprägung (struktur- oder artenreich, intakt, naturnah) (+) | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | | FFH-LRT | |
| Beschreibung | Standort: Wasserverh.: trocken bis feucht Bodenart: Sand, sandiger Lehm Strukturbesonderheiten: Welliges Relief. | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | Ja |
| | | Flächenanteil | 90 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| Standort | Belichtung | halbsonnig | 7,1 |
| Boden | Feuchte | mäßig feucht und wechselfeucht | 5,7 |
| | Stickstoff (N) | mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich | 5,7 |
| | Reaktion | mäßig sauer | 5,5 |
| Vegetation | Mahdverträglichkeit | gut schnittverträglich | 6,9 |
| Zeigerwerte | Futterwert | ausreichende Futterqualität | 5,2 |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 3 |
| | Giftpflanzen | | 0 |
| | Überschw.anzeiger | | 0 |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste | | | |
|--|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | HH | ND | SH | D |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Achillea millefolium (Gewöhnliche Schafgarbe) | 1 | 2m | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Agrostis capillaris (Rotes Straußgras) | 1 | 2a | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanz) | 1 | 2m | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Anthoxanthum odoratum (Gewöhnliches Ruchgras) | 1 | 1 | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Capsella bursa-pastoris (Gewöhnliches Hirtentäschel) | 1 | + | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Carex hirta (Behaarte Segge) | 1 | 2a | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Carex leporina (Hasenfuß-Segge) | 1 | + | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Cerastium semidecandrum (Fünfmänniges Hornkraut) | 1 | + | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel) | 1 | 1 | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Crepis capillaris (Grüner Pippau) | 1 | r | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Cynosurus cristatus (Gewöhnliches Kammgras) | 1 | 2m | | - | | | | | | | | | V | | | | |
| Geranium molle (Weicher Storchschnabel) | 1 | + | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Glechoma hederacea (Gundermann) | 1 | + | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Holcus lanatus (Wolliges Honiggras) | 1 | 2a | | - | | | | | | | | | | | | | |

Erhebungsbogen

B

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---|----------------|------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | | Interne Nr. | 66075 | |
| | | | DK5 DK5-GK | 8018 | 8020 |
| Handlungsbedarf | Nein | | DK5 - Name | Neuengamme-Ohe | |
| Bearbeitung | BRA | Kopie | Biotop-Nr. alt | 35 | 73 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Nein | Kartierung | 17.06.1997 | |
| Anzahl Abschnitte | 1 | | Fläche / Länge [m²/m] | 8740,2644 | |
| | | | Breite (lineare Abb.) [m] | | |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | Rote Liste | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|------------|----|----|----|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | § | HH | ND | SH | D | |
| Hypochaeris radicata (Gewöhnliches Ferkelkraut) | 1 | + | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Juncus effusus (Flutter-Binse) | 1 | + | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Lolium perenne (Ausdauerndes Weidelgras) | 1 | 2a | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Poa trivialis (Gewöhnliches Rispengras) | 1 | 2b | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Potentilla anserina (Gänse-Fingerkraut) | 1 | + | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Potentilla reptans (Kriechendes Fingerkraut) | 1 | + | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Rumex acetosella (Kleiner Sauerampfer) | 1 | + | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Stellaria media (Vogelmiere) | 1 | r | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Taraxacum spec. (Löwenzahn) | 1 | 2m | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Trifolium dubium (Kleiner Klee) | 1 | + | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Trifolium repens (Weiß-Klee) | 1 | 2a | | - | | | | | | | | | | | | | | |

Anzahl Rote Liste Arten

1

Anzahl Arten

25

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 2 |
| Biotoptyp | Nährstoffreicher Graben mit Stillgewässercharakter (2000) | Biotoptyp | FGR |
| - Zusatz | | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | | FFH-LRT | |
| Beschreibung | | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | |
| | | Flächenanteil | 10 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|--|-----|
| Standort | Belichtung | halbsonnig | 7,4 |
| Boden | Feuchte | naß | 7,9 |
| | Stickstoff (N) | mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich | 6,3 |
| | Reaktion | schwach sauer | 5,9 |
| Vegetation | Mahdverträglichkeit | mäßig bis gut schnittverträglich (erster Schnitt nicht vor Mitte Juni) | 5,5 |
| Zeigerwerte | Futterwert | mäßige Futterqualität | 3,8 |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 5 |
| | Giftpflanzen | | 1 |
| | Überschw.anzeiger | | 2 |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 66075 |
| | | DK5 DK5-GK | 8018 8020 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Neuengamme-Ohe |
| Bearbeitung | BRA | Biotop-Nr. alt | 35 73 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 17.06.1997 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 8740,2644 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste | | | |
|---|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|------------|----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | HH | ND | SH | D |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agrostis capillaris (Rotes Straußgras) | 1 | + | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Agrostis stolonifera (Ausläufer-Straußgras) | 1 | 2a | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Alopecurus geniculatus (Knick-Fuchsschwanz) | 1 | 2b | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Anthoxanthum odoratum (Gewöhnliches Ruchgras) | 1 | + | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Carex hirta (Behaarte Segge) | 1 | 2a | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Carex leporina (Hasenfuß-Segge) | 1 | + | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Glyceria fluitans (Flutender Schwaden) | 1 | 3 | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Holcus lanatus (Wolliges Honiggras) | 1 | 1 | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Juncus effusus (Flutter-Binse) | 1 | 1 | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Poa trivialis (Gewöhnliches Rispengras) | 1 | 1 | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Ranunculus flammula (Brennender Hahnenfuß) | 1 | 1 | | - | | | | | | | | | | | V | | |
| Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß) | 1 | 2a | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Rote Liste Arten | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Anzahl Arten | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland

Teilflächenbeschreibung

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|------|
| Teilflächentyp | | Teilflächen-Nr. | 3 |
| Biotoptyp | Zuordnung eines Biotoptyps fehlt! (2000) | Biotoptyp | XXX |
| - Zusatz | | - gesetzl. Grundl. | |
| FFH-LRT | | FFH-LRT | |
| Beschreibung | | Entw.potential LRT | |
| | | Hauptfläche | |
| | | Flächenanteil | 0 % |
| | | FFH-Unters.Fläche | Nein |
| | | Saatgutfläche | Nein |

Zeigerwerte der Pflanzenartenliste (Auswertung)

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| Standort | Belichtung | halbsonnig | 7,3 |
| Boden | Feuchte | frisch und mäßig frisch | 4,8 |
| | Stickstoff (N) | mäßig stickstoffarm bis stickstoffreich | 6 |
| | Reaktion | schwach sauer | 6,5 |
| Vegetation | Mahdverträglichkeit | gut schnittverträglich | 7,1 |
| Zeigerwerte | Futterwert | gute Futterqualität | 5,9 |
| | Wechselfeuchteanzeiger | | 1 |
| | Giftpflanzen | | 0 |
| | Überschw.anzeiger | | 0 |

Erhebungsbogen

B

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Projekt | Biotopkartierung Hamburg | Interne Nr. | 66075 |
| | | DK5 DK5-GK | 8018 8020 |
| Handlungsbedarf | Nein | DK5 - Name | Neuengamme-Ohe |
| Bearbeitung | BRA | Biotop-Nr. alt | 35 73 |
| Räumliche Abbildung | Fläche | Kartierung | 17.06.1997 |
| Anzahl Abschnitte | 1 | Fläche / Länge [m²/m] | 8740,2644 |
| | | Breite (lineare Abb.) [m] | |

Pflanzenartenliste

| Gruppe / Pflanzenart | MS | M | W | Vs | St | PA | Ph | Sz | VS | V | G | cf | § | Rote Liste | | | |
|--|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|-----------|------------|----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | HH | ND | SH | D |
| Tracheobionta (Gefäßpflanzen) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Achillea millefolium (Gewöhnliche Schafgarbe) | 1 | 2m | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Agrostis capillaris (Rotes Straußgras) | 1 | 1 | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Bromus hordeaceus (Weiche Trefle) | 1 | 3 | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Capsella bursa-pastoris (Gewöhnliches Hirtentäschel) | 1 | 2m | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel) | 1 | + | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Cirsium vulgare (Gewöhnliche Kratzdistel) | 1 | 2m | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Elymus repens (Gewöhnliche Quecke) | 1 | 3 | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Erodium cicutarium (Gewöhnlicher Reiherschnabel) | 1 | + | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Geranium molle (Weicher Storchschnabel) | 1 | r | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Holcus lanatus (Wolliges Honiggras) | 1 | 2a | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Hypochaeris radicata (Gewöhnliches Ferkelkraut) | 1 | 1 | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Lolium multiflorum (Vielblütiges Weidelgras) | 1 | 3 | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Lolium perenne (Ausdauerndes Weidelgras) | 1 | 2b | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Matricaria recutita (Echte Kamille) | 1 | + | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Poa trivialis (Gewöhnliches Rispengras) | 1 | 2m | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Taraxacum spec. (Löwenzahn) | 1 | 2m | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Trifolium repens (Weiß-Klee) | 1 | 3 | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Rote Liste Arten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Arten | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | |

MS: Mengensystem; M: Mengenangabe, W: Bewertung der Art (FFH-Monitoring), Vs: Vegetationsschicht, St: Status, PA: Autor Phänologie; Ph: Phänologie, Sz: Soziabilität, VS: Vitalitätssystem; V: Vitalität, G: Geschlecht, cf: unsichere Bestimmung, §: Schutz nach BNatSchG, HH: Rote Liste Hamburg, Nds: Rote Liste Niedersachsen, SH: Rote Liste Schleswig-Holstein, D: Rote Liste Deutschland